

Relación de ejercicios del tema 1

Topología II. Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática

Curso 2023/2024

Profesor: Rafael López Camino

Actualización: 17/10/2023, hora: 15:05:50

1. Si α es un arco en un espacio topológico y $\phi: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{I}$ es una aplicación continua con $\phi(0) = 0$ y $\phi(1) = 1$, probar que $\alpha \sim \alpha \circ \phi$.
2. En un conjunto estrellado de \mathbb{R}^n , probar que todo lado desde el centro de la estrella es homotópico al lazo constante en dicho punto. Deducir que dos arcos con puntos iniciales y finales en otros puntos son homotópicos.
3. Sea X un espacio arcoconexo, $x, y \in X$ y γ, σ dos arcos que unen y con x . Denotamos por ϕ_γ y ϕ_σ los homeomorfismos que inducen γ y σ entre $\pi_1(X, y)$ y $\pi_1(X, x)$. Probar que $\phi_\gamma = \phi_\sigma$ si y sólo si $[\gamma * \sigma^{-1}] \in Z(\pi_1(Y, y))$.¹
4. Probar que el cono de un espacio es arcoconexo.
5. En $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ se consideran los lazos con punto base $x_0 = (1, 0)$ dados por $\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ y $c_{x_0}(t) = x_0$. Probar que α no es homotópico a c_{x_0} .
6. Probar que $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ no es homeomorfo a \mathbb{R}^2 .
7. Probar que los siguientes espacios son simplemente conexos:
 - (a) Las letras T y H.
 - (b) En \mathbb{R}^n , dos bolas sólidas unidas por un segmento.
 - (c) Dos planos paralelos de \mathbb{R}^3 unidos por un segmento.
 - (d) Dos esferas de \mathbb{R}^3 unidas por un segmento.
 - (e) El cono $x^2 + y^2 = z^2$.
 - (f) El paraboloides hiperbólico $z = x^2 - y^2$.

¹Denotamos por $Z(G)$ al centro de un grupo G .

8. Encontrar, si es posible, dos conjuntos de \mathbb{R}^n disjuntos y simplemente conexos que al unirlos por un segmento (éste sólo toca a cada conjunto en un único punto) no da un espacio simplemente conexo.
9. Describir los generadores del grupo fundamental del toro visto como superficie de revolución en \mathbb{R}^3 .
10. Sea $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ una aplicación continua. Entonces, fijado cualquier punto $x_0 \in \mathbb{S}^1$, $f_*: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ es un homomorfismo de grupos, en particular, $f(x) = mx$ para algún $m \in \mathbb{Z}$. Se llama *grado* de f al número entero m . Hallar el grado de las aplicaciones: rotación de 90 grados, simetría respecto del eje x , aplicación antípoda y de $z \mapsto z^n$, $n \in \mathbb{N}$.
11. Sea (X, d) un espacio métrico compacto, $x, y \in X$. En $\Omega_{x,y}$ se define

$$d'(\alpha, \beta) = \sup\{d(\alpha(t), \beta(t)) : t \in \mathbf{I}\}.$$

Probar que d' es una distancia en $\Omega_{x,y}$. Probar que $\alpha \sim \beta$ si y sólo si existe un arco en $(\Omega_{x,y}, d')$ que une α con β .

12. Sean X e Y espacios arcoconexos y $f: X \rightarrow Y$ una aplicación continua. Probar o dar contraejemplos:
- (a) Si f es inyectiva, también lo es f_* .
- (b) Si f es sobreyectiva, también lo es f_* .
- (c) Si f es biyectiva, también lo es f_* .
13. Probar que si X es arcoconexa, la suspensión SX es simplemente conexa². Para ello, vemos ahora $SX = X \times \mathbf{I}$ identificando $X \times \{0\}$ es un punto y por otro lado, $X \times \{1\}$. Para ello tomamos $U = SX \setminus \{(x, 0)\}$ y $V = \{(x, 1)\}$ y probar que U y V son simplemente conexos (de manera parecida al cono) y que $U \cap V$ es arcoconexo (porque es homeomorfo a $X \times (0, 1)$).
14. Sabemos que $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$, en particular

$$([\alpha], 1) * (1, [\beta]) = ([\alpha], [\beta]) = (1, [\beta]) * ([\alpha], 1).$$

Hallar explícitamente una homotopía en $X \times Y$ que lleve $(\alpha, 1) * (1, \beta)$ en $(1, \beta) * (\alpha, 1)$.

²Si X no es arcoconexa, el resultado no es cierto y dar un contraejemplo.

15. Supongamos que X no es necesariamente arcoconexo. Probar que si A es una componente arcoconexa y $a \in A$, entonces $\pi_1(A, a) \cong \pi_1(X, a)$.
16. Sabemos que $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{S}^1$. Usando dicho homeomorfismo queremos relacionar $\pi_1(\mathbb{P}^1, [1])$ con $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$. Si $\alpha \in \Omega_1$, denotamos por γ_α el correspondiente lazo por el homeomorfismo con punto base $[1]$. Probar que si $\alpha \in \Omega_1$, entonces $\deg(\alpha) = 2\deg(\gamma_\alpha)$. Hallar $\deg(\beta)$, donde $\beta(t) = [(\cos \pi t, \sin \pi t)]$, $t \in [0, 1/2]$.
17. En el resultado de levantamiento de arcos de \mathbb{S}^1 , probar que para la parte de existencia del levantamiento, se puede sustituir \mathbf{I} por un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ estrellado y compacto. Del mismo modo, en la parte de unicidad se puede sustituir \mathbf{I} por cualquier subconjunto conexo de \mathbb{R}^n .

RETRACCIONES

1. Probar que la banda (cerrada) de Möbius \mathbb{M} tiene como retracto de deformación a un conjunto homeomorfo a \mathbb{S}^1 . Hacer el ejercicio viendo \mathbb{M} como un espacio cociente o como un subconjunto de \mathbb{R}^3 ('cinta doblada'). Como conclusión, su grupo fundamental es \mathbb{Z} . El mismo ejercicio se plantea con la banda abierta de Möbius.
2. Siguiendo con la banda de Möbius \mathbb{M} , probar que la curva borde de la misma (definir cuál es) es homeomorfa a una circunferencia y que no es un retracto de deformación de \mathbb{M} . Ya que es un lazo en \mathbb{M} , ¿qué elemento es en el grupo fundamental de \mathbb{M} ?
3. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es compacto y convexo, entonces A es un retracto de deformación de \mathbb{R}^n . Para ello, definir para cada $x \in \mathbb{R}^n$, $r(x) = a_x \in A$ el único punto de A tal que $d(x, A) = d(x, a_x)$.
4. Probar que $(0, 0)$ en $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ no tiene ningún entorno homeomorfo a \mathbb{R}^2 .
5. Probar que si $0 < r < s$, entonces \mathbb{D}_r es retracto de deformación de \mathbb{B}_s .
6. Probar que $\{(0, 0)\}$ es retracto de deformación de $\mathbb{S}^1(-1, 0) \cup \mathbb{S}^1(1, 0) \setminus \{(-2, 0), (2, 0)\}$.
7. Probar que los retractos y los retractos de deformación se preservan por homeomorfismos.
8. Probar que los retractos y los retractos de deformación se preservan por transitividad en la inclusión de espacios.

9. Probar que los retratos y los retratos de deformación se preservan por productos topológicos.
10. Sea $X = A \cup B$, A, B cerrados (o los dos abiertos). Si $A \cap B$ es un retrato (resp. de deformación) de B , entonces A lo es de X .
11. Si A es un retrato de un espacio Hausdorff, entonces es un cerrado.
12. Sea $Q \subset \mathbb{R}^n$ un compacto con una relación de equivalencia R e $I \subset \mathbb{R}^m$ otro conjunto compacto, ambos con la topología usual. Probar que

$$\left(\frac{Q}{R} \times \frac{I}{\tau_u}, \frac{\tau_u}{R} \times \tau_u \right) = \left(\frac{Q \times I}{R \times \tau_u}, \frac{\tau_u \times \tau_u}{R \times \tau_u} \right).$$

13. Probar que el cono CX es simplemente conexo. Para ello, probar que es contráctil en el punto $\{(x, 1)\}$. En primer lugar hay que probar el siguiente resultado:
Sea $f: X \rightarrow Y$ una identificación e I un espacio Hausdorff y localmente compacto³. Probar que

$$f \times 1_I: X \times I \rightarrow Y \times I$$

es una identificación.⁴

14. Probar que un plano proyectivo y una botella de Klein contiene una banda de Möbius.
15. Probar que un espacio contráctil es arcoconexo.
16. Se ha probado que $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tiene como retrato de deformación a \mathbb{S}^{n-1} . Queremos ‘extender’ este resultado del siguiente modo.

Consideramos la esfera \mathbb{S}^2 , el toro, la botella de Klein y el plano proyectivo considerados como conjuntos cocientes del cuadrado $Q = \mathbf{I}^2$ (o del disco, dependiendo). Tomamos el punto $p = [(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})]$. Probar que cada uno de los espacios anteriores quitado el punto p tiene como retrato de deformación al borde de Q tomando cociente, es decir, $A = \frac{(\mathbf{I} \times \{0,1\}) \cup (\{0,1\} \times \mathbf{I})}{\sim}$.

17. Sean $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$. Supongamos que $O_1 \subset X$ y $O_2 \subset Y$ son abiertos, $x_0 \in O_1$ y $y_0 \in O_2$. Si O_1 y O_2 son retratos de deformación de X e Y respectivamente, $O_1 \vee O_2$ lo es de $X \vee Y$.

³El espacio es localmente compacto si todo punto tiene una base de entornos compactos.

⁴El ejercicio anterior es un caso particular de éste (comprobar).

18. La figura del ocho, $\mathbb{S}^1(-1, 0) \cup \mathbb{S}^1(1, 0)$, es un retracto de deformación fuerte de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), -1, 0\}$.
19. La figura ocho es un retracto por deformación fuerte del toro menos un punto.
20. Consideramos el espacio peine

$$P = (\{0\} \times \mathbf{I}) \cup (K \times \mathbf{I}) \cup (\mathbf{I} \times \{0\}),$$

donde $K = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Probar que este conjunto es arcoconexo, no es localmente arcoconexo y que el conjunto $\{(0, 0)\}$ es un retracto de deformación del espacio, pero no $\{(0, 1)\}$.

21. Probar que $\{(\frac{1}{2}, 0, 0)\}$ es un retracto de deformación de $(\mathbb{S}^1 \times [0, 1]) \cup (\mathbb{D}^2 \times \{0\})$.
22. Probar que $\mathbb{D}^2 \setminus \{(\pm\frac{1}{2}, 0)\}$ tiene como retracto de deformación la figura del 8.
23. Probar que $\mathbb{R}^2 \setminus \{(\pm 1, \pm 1)\}$ tiene como retracto de deformación una flor de 4 pétalos alrededor de los puntos eliminados.
24. Consideramos todos los espacios topológicos cocientes de $\mathbf{I} \times \mathbf{I}$ que han salido en clase identificando aristas. Sin usar que son homeomorfos a espacios 'conocidos', probar que son Hausdorff. Del mismo modo, probar que la retracción radial desde $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ prueba que las aristas (en el cociente) es un retracto de deformación del espacio punteado en $[(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})]$. Generalizar ambos ejercicios a espacios topológicos que son cocientes de polígonos cerrados (junto con su interior) identificando aristas entre sí.
25. Extendemos el concepto de arcos homotópicas. Dos aplicaciones $f, g: X \rightarrow Y$ se llaman *homotópicas*, y escribimos $f \sim g$, si existe $H: X \times I \rightarrow Y$ continua tal que $h(x, 0) = f(x)$ y $H(x, 1) = g(x)$. Si f es homotópica a una aplicación constante, se dice que f es *nulhomotópica*.
- (a) Si $X \subset \mathbb{R}^n$ es convexo y $f: X \rightarrow Y$ es continua, entonces f es nulhomotópica. Lo mismo si $f: Y \rightarrow X$.
- (b) Si $f, g: X \rightarrow \mathbb{S}^n$ son continuas con $f(x) \neq -g(x)$ para todo $x \in X$, entonces $f \sim g$.
- (c) Sea $f: X \rightarrow Y$ continua. Entonces f es nulhomotópica si y sólo si f admite una extensión continua al cono CX .
- (d) Dar un ejemplo dos aplicaciones nulhomotópicas que no son homotópicas entre sí.

- (e) Probar que ser homotópicas es una relación de equivalencia en el conjuntos de las aplicaciones continuas de X a Y .
- (f) Dos espacios X e Y se dicen que son *homotópicos* si existe $f: X \rightarrow Y$ y $g: Y \rightarrow X$ continuas tales que $g \circ f \sim 1_X$ y $f \circ g \sim 1_Y$. Probar que en tal caso, los grupos fundamentales de X e Y coinciden.
- (g) Si A es un retracto de deformación de X , entonces A y X son homotópicos.
- (h) Probar que la figura del 8 es homotópica a dos cuadrados (sólo las aristas) pegados por un lado común.

TEOREMA DE SEIFERT-VAN KAMPEN

1. Hallar los grupos fundamentales de los siguiente espacios indicando los generadores:
 - (a) \mathbb{S}^2 junto con el segmento $[N, S]$.
 - (b) \mathbb{S}^2 y dos circunferencias disjuntas entre ellas de \mathbb{R}^3 tangente a \mathbb{S}^2 en N y S respectivamente.
 - (c) Unión de una esfera y un toro tangentes en un punto.
 - (d) Unión de dos toros tangentes.
 - (e) Un toro menos un punto, la botella de Klein menos un punto, el plano proyectivo menos un punto, la banda de Möbius menos un punto.
 - (f) Un toro de revolución junto una esfera que sea tangente a lo largo del círculo interior.
 - (g) Un polígono regular de n lados identificando los lados de la siguiente forma:
 - i. $n = 3$, aaa .
 - ii. $n = 6$, $aa^{-1}ba^{-1}a^{-1}b^{-1}$.
 - iii. $n = 6$, $ab^{-1}bcc$.
 - iv. $n = 7$, $abaaab^{-1}a^{-1}$.
 - (h) Una corona circular sólida, donde puntos antípodas de cada uno de los círculos (por separado) están relacionados entre sí.
 - (i) $(\mathbb{S}^1 \times [0, 1]) \cup (\mathbb{D}^2 \times \{0, 1\})$.
 - (j) Cuatro circunferencias de radio 1 del plano, cuyos centros se encuentran en un cuadrado centrado en el origen con vértices $(\pm 1, \pm 1)$.
 - (k) Dos toros, uno de ellos es tangente al otro a lo largo de la circunferencia interior del mismo.

- (l) Un toro sólido.
 - (m) $\mathbb{S}^1(-1, 0) \cup \mathbb{S}^1(1, 0) \cup [(-1, 0), (1, 0)]$.
 - (n) Tres circunferencias del plano tangentes exteriormente cada una con las otras dos.
 - (o) Lo mismo que antes pero cambiando circunferencias por esferas.
 - (p) Una circunferencia del plano junto con un triángulo inscrito en ella.
 - (q) Un triángulo del plano junto con un círculo inscrito en ella.
 - (r) \mathbb{S}^2 junto con un disco de radio 1 en su interior.
 - (s) \mathbb{S}^2 junto con dos discos de radio 1 en su interior y perpendiculares entre sí.
 - (t) Si $A = \{0, -1, 1\}$, el conjunto del plano dado por $(A \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times A)$.
 - (u) $\mathbb{RP}^2 \vee \mathbb{RP}^2$.
 - (v) El espacio \mathbb{D}^2 / \sim , donde $x \sim y$ si son iguales o hay un giro de 120 grados que me lleva uno en otro.
 - (w) Tres esferas tangentes en un punto, una tras otra.
 - (x) Un triángulo en \mathbb{R}^3 junto tres esferas disjuntas dos a dos y que cada una toca uno sólo de los vértices del triángulo.
2. Damos la definición del grado de un lazo de \mathbb{S}^1 en otro punto distinto de 1. Sea $z_0 = e^{2\pi\theta_0} \in \mathbb{S}^1$. Tenemos dos posibilidades de definir el grado. En primer lugar, y siguiendo la analogía de cómo se definió para lazos con punto base 1, si $\beta \in \Omega_{z_0}$, definimos $\deg(\beta) = \tilde{\beta}(1) - \tilde{\beta}(0)$, donde $\tilde{\beta}$ es el único levantamiento de β con $\tilde{\beta}(0) = \theta_0$. La otra posibilidad es usar el isomorfismo $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1, z_0)$. Si γ es un arco que une 1 con z_0 , definimos $\deg(\beta) = \deg\gamma * \beta * \gamma^{-1}$. Probar que ambas definiciones coinciden.
3. Hallar el grupo fundamental de:
- (a) una camiseta y de una camisa desabrochada.
 - (b) Una taza de café con asa.
 - (c) Un volante de tres radios.