

## Caso\_22\_1



Mujer de 61 años de edad. Hipertensa controlada. No existe otra patología. Menopausia a los 53 años.

Consulta por que desde hace unos tres años nota una pérdida de cabello localizada en la zona frontotemporal y en las cejas. Ha notado como la línea de implantación anterior del cabello ha sufrido una retrocesión progresiva hasta llegar a la situación actual.

No conoce casos parecidos entre sus familiares ni en las personas allegadas.

### ¿Cuál sería el diagnóstico más probable ?.

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1.- Alopecia areata SISAIFO.                             | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 2.- Alopecia androgenética femenina de patrón masculino. | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 3.- Alopecia androgenética femenina de patrón femenino.  | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 4.- Alopecia frontal fibrosante.                         | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 5.- Alopecia marginal.                                   | <a href="#">RESPUESTA</a> |

Respuesta INCORRECTA:

1.- La alopecia marginal es una forma de alopecia cicatricial que se ha relacionado tradicionalmente con el uso de peinados muy tirantes (coletas, trenzas...) que producirían un traumatismo en el folículo y ocasionarían, a la larga, una alopecia cicatricial.

2.- La distribución de la alopecia marginal es parecida a la AFF, pero puede afectar a la totalidad de la línea de implantación, por lo que podría confundir con una alopecia areata de la que se distinguiría por la ausencia de orificios foliculares en aquella que estarían presentes en la alopecia areata.

3.- De todas formas, en un estudio reciente (*British Journal of Dermatology* 2009 160, pp62–68) se demuestra que hay casos donde no hay antecedentes de peinados “tirantes” y se sospecha una etiología diferente, posiblemente autoinmune.

4.- En estas imágenes, tomadas del citado artículo, se observa que el aspecto clínico es diferente, que no se han destruido todos los folículos y que no hay eritema perifolicular.

