

ECUACIONES DIFERENCIALES

Curso 10–11

Relación de ejercicios 1: **Métodos elementales de resolución de EDOs**

Ecuaciones diferenciales en variables separadas y modelos

1.- La población $P(t)$ de un suburbio de una gran ciudad en un instante cualquiera se rige por

$$\frac{dP}{dt} = P(10^{-1} - 10^{-7}P), \quad P(0) = 5000,$$

en donde t se mide en meses. ¿Cuál es el valor límite de la población? ¿En qué momento será la población igual a la mitad de su valor límite?

2.- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x' &= e^t - \frac{2t}{t^2-1} & \text{(b)} \quad (x^2 + 9)y' + xy &= 0 \\ \text{(c)} \quad \frac{dy}{dx} &= 2xe^{-y} & \text{(d)} \quad x' &= \frac{1+t}{t^2x^2} \\ \text{(e)} \quad x' &= e^{t+x} \end{aligned}$$

3.- Un reactor transforma plutonio 239 en uranio 238 que es relativamente estable para uso industrial. Después de 15 años se determina que 0.0043 por ciento de la cantidad inicial A_0 de plutonio se ha desintegrado. Determina la semivida (tiempo necesario para que la cantidad inicial de los átomos se reduzca a la mitad) de este isótopo si la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad restante.

4.- Dadas dos funciones f, g derivables, sabemos que la identidad $(fg)' = f'g'$ es falsa en general. Si fijamos $f(x) = e^{x^3+2x}$, determina las funciones g que verifican dicha identidad.

Ecuaciones homogéneas y reducibles a homogéneas

5.- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 3x + y - 2 + y'(x - 1) &= 0 & \text{(b)} \quad (t^2x^2 - 1)x' + 2tx^3 &= 0, \text{ haciendo } x = z^\alpha \\ \text{(c)} \quad x + (x - t)x' &= 0 & \text{(d)} \quad 2t + 3x + (x + 2)x' &= 0 \end{aligned}$$

6.- Encontrar la curva plana que pasa por $(1, 1)$ y verifica que dado un punto cualquiera (x, y) , al considerar el corte de la recta tangente a la curva en ese punto con el eje de ordenadas y el corte de la recta normal con el eje de abscisas, su distancia al origen es la misma.

Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes

7.- Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales buscando (si es el caso) factores integrantes de la forma que se indica:

- (a) $\text{sen}(tx) + tx \cos(tx) + t^2 \cos(tx)x' = 0$
- (b) $\frac{\text{sen}(2x)}{y} + x + \left(y - \frac{\text{sen}^2 x}{y^2}\right)y' = 0$
- (c) $(3xy^2 - 4y) + (3x - 4x^2y)y' = 0$ con $\mu(x, y) = \mu(x^n y^m)$ (Febrero 93)
- (d) $xy'(y - 1) - y = 0$ con $\mu(x, y) = \mu(y)$
- (e) $(t + 1)^2 + (1 + t^2)x' = 0$ con $\mu(x, y) = \mu(x + y)$ (Febrero 96)
- (f) $(1 + xy + y^2) + (1 + xy + x^2)y' = 0$ con $\mu(x, y) = \mu(xy)$
- (g) $(x + y^2) + 2(y^2 + y + x - 1)y' = 0$ con $\mu(x, y) = \mu(e^{ax+by})$
- (h) $2xyy' = x^2 + y^2 + 1$ con $\mu(x, y) = \mu(y^2 - x^2)$

Ecuaciones diferenciales lineales

8.- Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones:

- (a) ¿Puede ser la función $\phi(t) = t^2$ (definida para $t \in \mathbb{R}$) solución de una ecuación lineal de primer orden homogénea? ¿Y de una ecuación lineal de primer orden no homogénea?
- (b) ¿Pueden ser las funciones $\phi(t) = e^t$ y $\psi(t) = e^{-t}$ (definidas para $t \in \mathbb{R}$) soluciones de una misma ecuación lineal de primer orden homogénea? ¿y de una ecuación lineal de primer orden no homogénea?

En caso afirmativo proporciona un ejemplo explícito.

9.- Calcula los valores de la constante $\mu \in \mathbb{R}$ que hacen que la ecuación diferencial $x' = (\mu + \cos^2 t)x$ tenga una solución π -periódica (es decir, $x(t) = x(t + \pi) \forall t \in \mathbb{R}$) no trivial.

10.- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales usando el método de variación de constantes:

- (a) $x' - tx = 3t$
- (b) $y' = 5y + \cos x$
- (c) $x' = \left(\frac{2t}{t^2+1}\right)x + t^3$
- (d) $x' - 2x = 4e^{2t}$

ecuaciones diferenciales lineales

11.- Resuelve los siguientes problemas de valores iniciales mediante la fórmula de variación de las constantes:

- (a) $x' + 3x = e^{-3t}$, $x(1) = 5$
- (b) $x' - \frac{x}{t} = \frac{1}{1+t^2}$, $x(2) = 0$
- (c) $x' = \cosh(t)x + \sinh(t)$, $x(0) = 1$

12.- Sean $a, b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas tales que $a(t) \geq c > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0.$$

Demostrar que todas las soluciones de la ecuación diferencial $x' = -a(t)x + b(t)$ tienden a cero cuando $t \rightarrow \infty$. (Indicación: usa la regla de L'Hôpital en el segundo término de la fórmula de variación de las constantes).

Ecuaciones diferenciales de Bernoulli y Riccati

13.- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli:

$$(a) 3tx' - 2x = \frac{t^3}{x^2} \quad (b) x' = e^t x^7 + 2x \quad (c) y' + \frac{y}{x} = \frac{\ln(x)}{x} y^2$$

14.- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Riccati usando la solución particular proporcionada:

$$(a) y' = y^2 - xy + 1 \text{ con } y_p(x) = x \\ (b) y' = x^{-4} - y^2 \text{ con } y_p(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$$

15.- Se considera la ecuación diferencial de Riccati

$$y' = -\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} + y^2.$$

- (a) Busca una solución particular de la forma $y = x^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.
- (b) Encuentra la solución de la ecuación que cumple $y(1) = 2$ y calcula, si es posible, el límite cuando $x \rightarrow \infty$ de dicha solución.

Miscelánea

16.- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales usando el método que convenga en cada caso:

(a) $3e^t \tan(x) + (2 - e^t) \sec^2(x)x' = 0$	(b) $(3t^2x + x^3)x' + 2t^3 = 0$
(c) $xy' + y = y^2 \log(x)$	(d) $t \cos(t+x) + \sin(t+x) + t \cos(t+x)x' = 0$
(e) $(3tx + x^2) + (3tx + t^2)x' = 0$	(f) $tx \cos(tx) + \sin(tx) + (t^2 \cos(tx) + e^x)x' = 0$
(g) $3x + 3e^t x^{\frac{2}{3}} + tx' = 0$	(h) $x' = \frac{1}{x+t}$
(i) $y' = \frac{y}{2y \ln(y) + y - x}$	(j) $xy' + y = y^2 \ln(x)$
(k) $y' = e^x - \frac{2x}{x^2 - 1}$	(l) $y + (y - x)y' = 0$
(m) $y' = 1 + e^{2x}$	(n) $(x^2 + 9)y' + xy = 0$
(o) $y' = \frac{1+x}{x^2 y^2}$	(p) $y' = \frac{y}{x} (\log(y) - \log(x))$
(q) $xy' + y = 2x$	(r) $y' = \ln(x^y)$

$$y' = 0,$$

17.- Decide de forma razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- (a) Una solución del problema de valores iniciales $x' = x^2 + t^2$, $x(1) = 2$, definida en un intervalo abierto que contenga a $[1, 2]$ satisface $x(2) = 1$.
- (b) La ecuación de Riccati $y' + y + y^2 + e^x = 0$ se transforma en una ecuación diferencial lineal de orden dos $z'' + a(x)z' + b(x)z + c(x) = 0$ mediante el cambio de variable $y = \frac{z'}{z}$ (Septiembre 03).