

Tema 2- Curso 1⁰-B, Ciencias Ambientales

Asignatura: Matemáticas

Fecha: 29 de octubre de 2020

Actualización: 29/10/2020, hora: 09:04:52

Como ya sabemos, la idea de integrar es hacer transformaciones hasta llegar a integrales que sean más fáciles, por tanto:

♣ ¡Importante! No se va a repetir la solución de integrales que ya han salido en días previos.

Ejercicio resuelto 1. Hallar

1. $\int x(x^2 + 1)^2 dx$.

2. $\int x(4x^2 + 3)^3 dx$.

SOLUCIÓN. 1. Reconocemos que es una integral por sustitución porque el derivada del paréntesis es $2x$, que es lo que está fuera, salvo el 2 que está multiplicando:

$$t = (x^2 + 1) \rightsquigarrow dt = 2x dx \rightsquigarrow dx = \frac{1}{2x} dt$$

$$\int x(x^2 + 1)^2 dx = \int x \cdot t^2 \frac{1}{2x} dt = \frac{1}{2} \int t^2 dt = \frac{1}{2} \frac{t^3}{3} + c = \frac{1}{6} (x^2 + 1)^3 + c.$$

Otra manera es: la derivada de lo del paréntesis es $2x$ y fuera está x , luego multiplico y divido por 2 (para que no cambie la integral), obteniendo entonces una integral inmediata:

$$\int x(x^2 + 1)^2 dx = \frac{1}{2} \int 2x(x^2 + 1)^2 dx = \frac{1}{2} \frac{(x^2 + 1)^3}{3} + c.$$

Otra manera es desarrollando el cuadrado, obteniendo al final un polinomio e integrando sumando a sumando:

$$\int x(x^2 + 1)^2 dx = \int x(x^2 + 2x + 1) dx = \int (x^3 + 2x^2 + x) dx = \frac{x^4}{4} + 2\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + c.$$

2. De nuevo, la derivada del paréntesis es $8x$ y fuera es x . Podemos hacer $t = (4x^2 + 3)$, podemos también desarrollar el paréntesis obteniendo un polinomio, pero aquí es más fácil multiplicar y dividir por 8 porque la integral es casi inmediata:

$$\int x(4x^2 + 3)^3 dx = \frac{1}{8} \int 8x(4x^2 + 3)^3 dx = \frac{1}{8} \frac{(4x^2 + 3)^4}{4} + c.$$

□

Practicamos ahora con integrales que tienen raíces cuadradas o similares. Varias observaciones que hay que tener presente:

1. No son fáciles a no ser que sean 'casi inmediatas'.
2. No hay un método único para resolver, dependen de la función. A veces, la sustitución

$$\int \sqrt[n]{P(x)} dx, \quad t^n = P(x),$$

puede ser útil porque la raíz quedaría sustituida por $P(x)$: el problema se pasa a dx .

3. Pequeñas "variaciones" hacen que la integral pase de resolverse a no resolverse y viceversa.

Ejercicio resuelto 2. 1. $\int \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx$.

2. $\int x\sqrt[3]{x+1} dx$.

SOLUCIÓN. 1. La derivada del radicando es 2, sin embargo fuera tenemos x , luego la sustitución $t = 2x - 1$ parece no viable. Sin embargo vamos a hacerla para ver si es posible:

$$t = 2x - 1 \rightsquigarrow dt = 2 dx \rightsquigarrow dx = \frac{1}{2} dt.$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{t}} dt.$$

Tenemos que cambiar la función de x a función de t . Por la sustitución hecha:

$$x = \frac{t+1}{2}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{t}} dt &= \frac{1}{2} \int \frac{t+1}{2} \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{4} \int \left(\frac{t}{\sqrt{t}} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right) dt = \frac{1}{4} \int t^{1/2} dt + \frac{1}{4} \int t^{-1/2} dt \\ &= \frac{1}{4} \frac{t^{3/2}}{3/2} + \frac{1}{4} \frac{t^{1/2}}{1/2} + c = \frac{1}{6} (2x-1)^{3/2} + \frac{1}{2} (2x-1)^{1/2} + c. \end{aligned}$$

Otra manera es la siguiente. Hacemos $t^2 = 2x - 1$ para que la raíz desaparezca:

$$t^2 = 2x - 1 \rightsquigarrow 2t dt = 2 dx \rightsquigarrow dx = t dt.$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{t^2}} dt = \int \frac{x}{t} dt.$$

Quitamos ahora x , que es

$$x = \frac{1}{2}(t^2 + 1).$$

Comparar con la sustitución de antes, donde x era diferente.

$$\int \frac{x}{t} dt = \frac{1}{2} \int \frac{t^2+1}{t} t dt = \frac{1}{2} \int (t^2+1) dt = \frac{1}{2} \left(\frac{t^3}{3} + t \right) + c.$$

Otra diferencia con la sustitución de antes: ahora t es una raíz cuadrada, $t = \sqrt{2x-1} = (2x-1)^{-1/2}$. Entonces queda

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{(\sqrt{2x-1})^3}{3} + \sqrt{2x-1} \right) + c.$$

2. La derivada de lo de dentro es 1, que no es múltiplo de x que es lo que está fuera. Podemos hacer $t = x + 1$ como antes a ver qué sucede:

$$t = x + 1 \rightsquigarrow dt = dx,$$

$$\begin{aligned} \int x \sqrt[3]{x+1} dx &= \int x \sqrt[3]{t} dt = \int (t+1) \sqrt[3]{t} dt = \int t \sqrt[3]{t} dt + \int \sqrt[3]{t} dt = \\ &= \int t^{4/3} dt + \int t^{1/3} dt = \frac{t^{7/3}}{7/3} + \frac{t^{4/3}}{4/3} + c = \frac{3}{7}(x+1)^{7/3} + \frac{3}{4}(x+1)^{4/3} + c. \end{aligned}$$

La otra manera es hacer t^3 igual a lo de dentro de la raíz:

$$t^3 = x + 1 \rightsquigarrow 3t^2 dt = dx, \quad x = t^3 - 1, \quad t = (x+1)^{1/3}.$$

$$\begin{aligned} \int x \sqrt[3]{x+1} dx &= \int x \sqrt[3]{t^3} 3t^2 dt = \int (t^3 - 1) \cdot t \cdot 3t^2 dt = 3 \int t^3 (t^3 - 1) dt = \\ &= 3 \int (t^6 - t^3) dt = 3 \frac{t^7}{7} - 3 \frac{t^4}{4} + c = \frac{3}{7}(x+1)^{7/3} + \frac{3}{4}(x+1)^{4/3} + c. \end{aligned}$$

Si observamos las dos integrales, hemos tenido “suerte” de que haya salido bien. \square

En el siguiente vemos cómo pequeñas variaciones cambian drásticamente la solución de la integral (se puede).

Ejercicio resuelto 3. 1. $\int x \sqrt{1-x^2} dx$ (versión 1).

2. $\int \sqrt{1-x^2} dx$ (versión 2).

3. $\int x^2 \sqrt{1-x^2} dx$ (versión 3).

SOLUCIÓN. 1. La derivada del radicando es $-2x$ que es lo que hay fuera, salvo $2x$, luego es claro que es casi inmediata:

$$t = 1 - x^2 \rightsquigarrow dt = -2x dx \rightsquigarrow -\frac{1}{2x}.$$

$$\int x \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int x \sqrt{t} \frac{1}{x} dt = -\frac{1}{2} \int t^{1/2} dt = -\frac{1}{3} (1-x^2)^{3/2} + c.$$

2. Esta integral se explicó en teoría, donde la sustitución válida es $x = \sin(t)$. No repetimos, y quedaba

$$\frac{1}{2} \left(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin(x) \right)$$

3. Comparando con el primer ejercicio, tenemos dos posibilidades, $t = 1 - x^2$ o $t^2 = 1 - x^2$. Veamos la primera:

$$t = 1 - x^2 \rightsquigarrow dt = -2x dx \rightsquigarrow dx = -\frac{1}{2} \frac{dt}{x}$$

$$\int x^2 \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int x \sqrt{t} dt$$

Quitamos la x mediante $x = \sqrt{1-t}$,

$$= -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-t} \sqrt{t} dt = -\frac{1}{2} \int \sqrt{t-t^2} dt$$

quedando una integral que parece más difícil que la primera.

Cambiamos la sustitución por la segunda posibilidad:

$$t^2 = 1 - x^2 \rightsquigarrow 2t = -2x dx \rightsquigarrow dx = -\frac{t}{x} dt.$$

$$\int x^2 \sqrt{1-x^2} dx = - \int x^2 \sqrt{t^2} \frac{t}{x} dt = - \int x \cdot t^2 dt = - \int \sqrt{1-t^2} t^2 dt$$

!quedando la misma integral que al principio!

Probamos ahora, como en la segunda integral, $x = \sin(t)$.

$$x = \sin(t) \rightsquigarrow dx = \cos(t) dt.$$

$$\int x^2 \sqrt{1-x^2} dx = \int \sin^2(t) \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t) dt = \int \sin^2(t) \cos^2(t) dt.$$

Esta integral corresponde a la parte de teoría de “integración de funciones trigonométricas”. Vamos a hacerla porque a fin de cuentas es de nuevo por sustitución. Ahora el integrando es par en seno y en coseno, luego se cambia a funciones del ángulo doble. Para ello usamos la identidad

$$\sin(t) \cos(t) = \frac{1}{2} \sin(2t)$$

luego la integral es

$$= \frac{1}{4} \int \sin^2(2t) dt$$

Usamos la identidad

$$\sin(t)^2 = \frac{1 - \cos(2t)}{2},$$

pero reemplazando t por $2t$:

$$= \frac{1}{8} \int (1 - \cos(4t)) dt$$

cuya integral es inmediata:

$$= \frac{1}{8} \left(t - \frac{1}{4} \sin(4t) \right) = \frac{1}{8} t - \frac{1}{32} \sin(4t) + c = \frac{1}{8} \arcsin(x) - \frac{1}{32} \sin(4 \arcsin(x)) + c.$$

Concluimos como habíamos dicho al principio: pequeñas variaciones en la integral hacen que su resolución cambie drásticamente. □