

Caso_23_5.

Mujer de 45 años de edad, fumadora, que mide 1,60 y pesa 85 kilos. Nos consulta por las lesiones que se ven en la imagen, bilaterales y, además, otras similares en región perineoglútea.

Según nos cuenta la paciente, desde que tenía unos veinte años empezaron a salirle en ambas axilas unas lesiones parecidas a las que ahora tiene, con mucha pus, dolor y, a veces fiebre alta. Estos episodios se repetían con frecuencia, varias veces al año, apareciendo unos bultos cubiertos por piel de color rojo que aumentaban de volumen, con dolor intenso y luego se reblandecía y su médico se los “abría” con bisturí (salía pus cremoso y maloliente) y le mandaba unos antibióticos. Poco después le empezaron a salir otras lesiones similares en las ingles y, hace unos meses en la areola mamaria del lado izquierdo.

Entre los antecedentes dice que tuvo en la pubertad un acné ligero que se quitó sin tratamiento y no ha dejado cicatrices. No tiene ninguna enfermedad ni toma ningún medicamento.



¿Cuál sería el diagnóstico más probable ?.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.- Tuberculosis colicuativa. | RESPUESTA |
| 2.- Actinomicosis | RESPUESTA |
| 3.- Hidrosadenitis. | RESPUESTA |
| 4.-Quistes epidérmicos infectados | RESPUESTA |
| 5.- Adenopatías | RESPUESTA |